

การป้องกันโรค

โรคนี้บ่งบอกว่าคนป่วย แต่ป้องกันได้โดย

1. ควรแยกตัวป่วย ไม่ให้คนอื่นใกล้กันเป็นเดียว

2 อาพิธย์

2. หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่น เช่น แก้วน้ำ ขวดนม ช้อน ชาม เสื้อผ้า ของเล่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น

3. ฝึกเด็กให้มีสุขอนตี้ที่ติด ไม่ควรให้เด็กดูน้ำ หรือเอาของเด่นใส่ปาก

4. ผู้ป่วยควรแนะนำบุตรหลานและผู้เสียค่าเด็กให้รักษาความสะอาด ตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบายน้ำ ด้วยเฉพาะหลังการซื้น ถ่ายและ ก่อนนอน เช่น สنانมเด็กเด่น สรวยว่ายน้ำ และหางสระพสินค้า และ ผู้ใหญ่ดูเด็กต้องล้างมือให้สะอาด ทุกครั้งหลังสัมผัสทุกอย่าง น้ำลาย หรืออุจจาระ

เด็กป่วย



องค์การบริหารส่วนตำบลเชาไฟพร

อ.รังษี จ.ตั้ง

โทร./โทรศัพท์ 075-290869

芳草 1 สวนผักกับน้ำ 30 สวน



คู่มือสำหรับประชาชน

โรคเมือ เท้า ปาก



5. สถานบริการเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องจัดให้มี ว่างานนี้มีผลต่อสุขภาพเด็ก หมั่นดูแลรักษา ศรีษะและน้ำอุ่นๆ ให้สะอาด อย่างสมอ หากพบเด็กป่วยต้องรีบป้องกันไว้ให้ชื่อแพร่ ไปยังเด็กคนอื่น ๆ ควรแนะนำผู้ปกครอง ให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ 7 วัน หรือจอกกว่าจะหายเป็นปกติ ระหว่างนี้มีความพากเพียร ในสถานที่แอดอัต เช่น สนามเด็กเล่น สรวยว่ายน้ำ และห้องสระพสินค้า และ ผู้ใหญ่ดูเด็กต้องล้างมือให้สะอาด ทุกครั้งหลังสัมผัสทุกอย่าง น้ำลาย หรืออุจจาระ

จัดทำโดย

***หากเมือเด็กป่วยจำนวนมาก อาจจำเป็นต้องปิด สถานที่ซึ่งวิเคราะห์ (1-2 สัปดาห์) และทำการเฝ้าระวัง อาการเชื้อโรค โดยอาจใช้สารสีลดคลายเจ็บชาของน้ำยา

โรคมือ เห้า ปาก

อาการของโรค

เกิดจากเชื้อไวรัสส์ไส้เลือดชนิดที่ไม่ไวรัสทางเดินหายใจแก้ไข ได้แก่ ตื๊อกนัคกีโอลีซ (Coxsackie A,B) และพับ ไลบอยในคุณเม็ดกระดาษและเต็กเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประภายอดลอดดี แต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้านักเรียน อาการมักเย็นและซึม โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง

หลังจากได้รับเชื้อ 3 - 6 วัน ผู้ติดเชื้อจะเริ่มมีไข้ 1-2 วัน มีอาการเป็นປ้ำและไม่ยอมทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ่มก้น ต่อมน้ำลายเป็นตุ่มพองใส ซึ่งบวมเรืองรอง ๆ จะอักเสบและแดง ต่อมามีตุ่มแดงแตกออกเป็นแผลหกุมตื้น ๆ จะพบตุ่มน้ำรอยสีน้ำเงิน (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ ผ้าเหรา และอาจพบที่ก้นด้วย อาการจะดีลงตามเวลาและหายเป็นปกติ อาการโดยเฉพาะการลดตัว แสดงถึงการเจ็บปวดจางๆ ผ่านไป 7-10 วัน

การแพทย์ติดต่อของโรค

การติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรง โรคพาร์ติตต์ต่อป้ายในช่องเส้นปอดหรือของปูกาย โดยเชื้อไวรัสอาจติดมา กับมือหรือของล่นที่เขื้อนน้ำลาย น้ำนม ก้นแจกร่วมพองและแผ่น หรืออุจจาระของปูกาย และอาจเกิดจากการร้อง泣ความดันในรูรยางที่เต็มอากาศทุกเส้นหรือหายใจล้าหอบรุ้ง 1 เดือน จะพบเชื้อในอุจจาระได้ แต่การติดต่อในระบบป็นจะเกิดขึ้นได้น้อยกว่า

ผลของการติดเชื้อไวรัสจะทำให้เกิดอาการไข้ 3-6 วัน ผู้ติดเชื้อจะเริ่มตัวมีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย ต่อมากลับอยู่ในคุณเม็ดกระดาษและเต็กเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประภายอดลอดดี แต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้านักเรียน ส่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ่มก้น ต่อมน้ำลายเป็นตุ่มพองใส ซึ่งบวมเรืองรอง ๆ จะอักเสบและแดง ต่อมามีตุ่มแดงแตกออกเป็นแผลหกุมตื้น ๆ จะพบตุ่มน้ำรอยสีน้ำเงิน (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ ผ้าเหรา และอาจพบที่ก้นด้วย อาการจะดีลงตามเวลาและหายเป็นปกติ อาการโดยเฉพาะการลดตัว แสดงถึงการเจ็บปวดจางๆ ผ่านไป 7-10 วัน

โรคมือ เห้า ปาก หากไม่มีภาวะแทรกซ้อน เป็นโรคที่สามารถหายได้เอง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน การรักษาจึงเป็นเพียงการประคับประคองและบรรเทาอาการที่เกิดขึ้น แต่การรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการเจ็บปวดจากผื่นแพ้ ก็สามารถหายด้วยยาชาป้ายบริเวณที่เป็นแพ้ก่อนรับประทานอาหาร ในการนี้พื้นที่มีภาวะแทรกซ้อนให้รักษาตามอาการเป็นส่วนใหญ่ หลังจากการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสที่ก่อโรค แต่อาจเกิดโรคเมือเห้าปาก ซึ่งได้จากเดือนหน้าโรครักษานั้นผู้ป่วยควรดูแลตัวเองอย่างดี ไม่ย้อมรับประทานอาหาร เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียนบ่อยๆ ไม่ยอมรับประทานอาหารและน้ำ ซึ่งควรพาบุตรลงนอนพับเบญจ

