

โรคไข้วีหนู

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อถิ่น โทสไปร่า มีหนูเป็นตัวนำโรคติดต่อจากปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อมีหนูปนเปื้อนอยู่ตามน้ำดินเปียกชื้นหรือพืช ผัก เชื้อสามารถไชเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังตามรอยแผลและรอยขีดข่วน และเยื่อของปาก ตา จมูก



การป้องกัน

- หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำ แช่หรือลุยในน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อจากปัสสาวะสัตว์นำโรค ถ้าจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ต
- เกษตรกร ผู้ที่ทำงานที่เสี่ยงต่อโรค ใช้ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ต
- ถ้าพบสัตว์ติดเชื้อมีต้องแยกออกเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังสัตว์ตัวอื่นๆ หรือเกิดการปนเปื้อนเชื้อบริเวณอาศัย
- ควบคุมกำจัดหนูในบริเวณที่อยู่อาศัย
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่สุนัข (เช่น โคกระปือ) และสัตว์เลี้ยง (เช่น สุนัข)

อาการ

มีไข้เฉียบพลันปวดศีรษะรุนแรง หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ ตาแดง อาจมีไข้ติดต่อกันหลายวัน สลับกับระยะ ไข้ลด มีจุดเลือดออก ตามผิวหนังและเยื่อคุดับและไควยดำรุนแรงอาจเสียชีวิต

การรักษา

ให้ยาปฏิชีวนะ โดยเร็วที่สุดจะช่วยลดความรุนแรงและป้องกันอาการแทรกซ้อนของโรคได้



โรคไข้วีหนู



จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
อ.รัชฎา จ.ตรัง
โทร./โทรสาร 075-290869